

Protocolos

(0 cómo administrar MMS)

Orden alfabético de enfermedades

Abuso de Drogas	Protocolo 1000
Acné	Protocolo 1000, aplicación de Protocolo 3000 en la zona afectada una vez al día, una aplicación horaria de spray (10 gotas por cada 28 g) por otras 8-9 horas, Protocolo de bolsa una vez al día para el tratamiento de otras áreas de la cara
Aftas / Herpes labial	Protocolo 1000, Protocolo botella de spray (10 gotas activadas cada 28 g)
Agrandamiento de la próstata	Protocolo 1000, Protocolo de enema
Alergias	Protocolo 1000. Dependiendo del tipo de alergia, baños diarios, Protocolo bolsa, Protocolo de botella de spray (10 gotas por cada 28 g) y/o terapia de inhalación (con no más de 2 gotas de MMS activado y con respiración muy suave)
Andropausia	Protocolo 1000
Anemia ferropénica	Protocolo 1000, también puede necesitar la vitamina B12 y/o suplementos de hierro
Anorexia nerviosa	Protocolo 1000
Artritis	Protocolos 1000 y 3000
Artritis reumatoide	Protocolo 1000, Protocolo 3000
Artritis reumatoide juvenil	Protocolo 1000, Protocolo 3000 una vez por día
Asma	Protocolo 1000 y terapia de inhalación (precaución: no use más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Autismo	Protocolo 2000 (aumento de cantidades de dosis muy lentamente), enemas, con o sin DMSO

Bronquitis	Protocolo 1000, terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas activado MMS y respirar suavemente), Protocolo 3000 una sola vez por día en el pecho
Bursitis	Protocolo 1000, Protocolo 3000 sólo de 1 a 3 veces por día en las zonas afectadas, Protocolo de baño
Cálculos biliares	Protocolo 1000
Cálculos Renales	Protocolo 1000 con una gran cantidad de agua
Calvicie	Spray de mezcla (10 gotas activadas por cada 28 g) en el cuero cabelludo una vez por hora durante 10 horas por día, Protocolo 1000
Cáncer	Protocolos 2000 y 3000, el Protocolo de baño, Protocolo bolsa, Protocolo de enema, Protocolo de inhalación (no usar más de 2 gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Cáncer de cerebro	Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Cáncer de colon	Protocolo 2000 y 3000, Protocolo de enema, Protocolo de baño, Protocolo bolsa, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Cáncer de cuello de útero	Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de duchas, Protocolo de enema, Protocolo de baño, Protocolo bolsa, Protocolo inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Cáncer de estómago	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de enema, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño
Cáncer de hígado	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de enema, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño, Protocolo de inhalación (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
Cáncer de hueso	Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)

Cáncer de Mama	Protocolos 2000 y 3000, duchas vaginales con 25 gotas activado en un litro de agua cada dos días (este ha sido un éxito para las mujeres, ya que el MMS llega al pecho a través del cuello uterino), Protocolo de baño, Protocolo bolsa, Protocolo de enema, Protocolo inhalación (uso no más de 2 gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Cáncer de ovario	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño, Protocolo de ducha, Protocolo de enema, Protocolo de inhalación (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
Cáncer de piel	Protocolo 2000, Protocolo 3000 (aplicar directamente la solución en las lesiones), Protocolo de bolsa, Protocolo de baño
Cáncer de Próstata	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, Protocolo de inhalación (no usar más de 2 gotas activa y respirar suavemente)
Cáncer de pulmón	Protocolo 2000, Protocolo 3000, terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente), Protocolo de bolsa, Protocolo de baño, Protocolo de enema
Cáncer de vejiga	Protocolos 2000 y 3000
Cáncer Testicular	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
Cándida	Protocolo 1000, Protocolo de enema, Protocolo de bolsa, Protocolo de ducha para las mujeres, Protocolo de baño
Caries	Cepillarse los dientes, las encías y la lengua con 10 gotas de MMS activado por cada 28 g de agua, activar 3 gotas en un vaso pequeño o recipiente de plástico y coloque su boca sobre la apertura de tal manera que la solución no entre en su boca mientras respira a través su nariz. No respirar los vapores. Simplemente deje el humo en la boca durante 5 minutos y no más.

Caspa	Rocíe el cuero cabelludo con una solución de atomizador (10 gotas de MMS activado cada 28 g de agua) varias veces al día. Causa blanqueo con el tiempo.
Colesterol	Protocolo 1000
Conjuntivitis	Prepare una solución de 4 gotas de MMS activado en agua 1/2 taza y colocar de 2 a 3 gotas en cada ojo cada hora hasta que estén bien; Protocolo 1000
Conjuntivitis	Prepare una solución de 4 gotas de MMS activado en 1/2 taza de agua y colocar 2-3 gotas en cada ojo cada hora hasta que estén bien; Protocolo 1000
Costra Láctea	Rocíe el cuero cabelludo con una solución de atomizador (10 gotas de MMS cada 28 g de agua)
Dengue	Protocolo 1000
Depresión	Protocolo 1000
Dermatitis	Rocíe el área afectada con una solución de atomizador (10 gotas de agua activado por onza)
Diabetes	Protocolo 1000, si no hay resultados en 2 semanas, entonces 2000, siempre que sea necesario
Diabetes Juvenil	Protocolo 1000, puede cambiar al Protocolo 2000 después de dos semanas si es necesario
Diabetes mellitus insulina dependiente	Protocolo 1000, puede cambiar el Protocolo 2000, después de dos semanas si es necesario
Diarrea	Protocolo 6 y 6 y luego Protocolo 1000
Disfunción eréctil	Protocolo 1000
Dislexia	Protocolo 1000
Diverticulitis	Protocolo 1000
Dolor de cabeza	Protocolo 6 y 6, luego Protocolo 1000
Dolor de espalda	Protocolo 1000, Protocolo 3000 aplicar una sola vez en la zona afectada, Protocolo de enema
Dolor en las articulaciones	Protocolo 1000, aplicación de Protocolo 3000 una vez al día en las articulaciones
Eczema	Protocolo de botella de spray (10 gotas de MMS activado cada 28 g de agua), Protocolo 1000
Endometriosis	Protocolo 1000, Protocolo de ducha

Enfermedad Celíaca	Protocolo 1000, Protocolo de enema
Enfermedad de Alzheimer	Protocolo 1000 y si no hay progreso Protocolo 2000 en 2 semanas
Enfermedad de Crohn	Protocolo 1000, Protocolo de enema
Enfermedad de la vesícula biliar	Protocolo 1000
Enfermedad de las Encías	Aplique la solución de 4 gotas de MMS activado en 1/2 taza de agua con cepillo de dientes 3 veces al día después de las comidas. Cepillar encías, borde de las encías y lengua también. En casos graves, puede también aplicarse DMSO con cepillo de dientes una vez al día para una penetración más profunda.
Enfermedad de las vacas locas	Protocolo 1000
Enfermedad de Lyme	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño
Enfermedad de Parkinson	Protocolo 1000, puede cambiar el Protocolo 2000, después de dos semanas si es necesario
Enfermedad de Reflujo Ácido	Protocolo 1000
Enfermedad del corazón	Protocolo 1000
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	Protocolo 1000, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Enfermedades del riñón	Protocolo 1000
Epilepsia (convulsiones)	Protocolo 1000
Erupciones en la piel	Protocolo 1000, Protocolo botella de spray, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
Esclerosis múltiple (EM)	Protocolo 2000
Fibromas	Protocolo 1000, después 2000 si no hay resultados en 2 semanas
Fibromialgia	Protocolos 1000 y 3000
Fiebre reumática	Protocolo 1000
Fractura	Protocolo 1000
Glomerulonefritis (nefritis)	Protocolo 1000
Gonorrea	Protocolo 1000, Protocolo de ducha para las mujeres
Gota	Protocolo 1000, Protocolo 3000 en las articulaciones afectadas
Gripe	Protocolo 6 y 6, luego Protocolo 1000, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar

suavemente)

Gripe	Protocolo 6 y 6, Protocolo 1000
Hemorroides	Protocolo de botella de spray, Protocolo de enema, Protocolo 1000
Hepatitis	Protocolo 1000
Herpes	Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray
Herpes genital	Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray
Hiper glucemia (azúcar alta)	Protocolo 1000, después de 2 semanas puede cambiar al Protocolo 2000, si es necesario
Hipertensión (presión arterial alta)	Protocolo 1000
Hipertiroidismo	Protocolo 1000
Hipotiroidismo	Protocolo 1000, 50-100mg de suplemento de yodo al día
Infección del tracto urinario (ITU)	Protocolo 1000
Infección por estafilococos (MRSA)	Protocolo 1000, Protocolo de gas (Active 6 gotas de MMS en un vaso transparente y ubique la boca del vaso sobre la llaga del lado derecho, de tal manera que el líquido no toque la piel. Deje en el lugar 5 minutos y no más. Cubrir con vaselina y una venda y esperar por lo menos 4 horas antes de hacerlo otra vez.)
Infección por hongos (Cándida)	Protocolo 1000, Protocolo de ducha para las mujeres, Protocolo de botella de spray
Infecciones del oído	Activa 4 gotas de MMS y añadir 1/2 taza de agua. Caída de gotas en el oído afectado y permitir que penetre profundamente acostado de lado.
Infecciones sinusales	Protocolo 1000, también mezclar 4 gotas de MMS activado con una 1/2 taza de agua, coloque unas gotas en cada fosa nasal mientras está acostado boca arriba en una cama y cuelgue su cabeza sobre el borde, para permitir que la solución penetre profundamente
Inflamación de la garganta	Protocolo 1000, cepillarse los dientes y la lengua y hacer gárgaras con una solución de 10 gotas por MMS activado por cada

28g de agua

Insuficiencia Cardíaca Congestiva	Protocolo 1000
Lesiones Cerebrales	Protocolo 1000
Leucemia	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
Mal aliento (halitosis)	Protocolo 1000, cepillar dientes y lengua con 10 gotas por MMS activado solución por cada 28 g de agua
Mal de altura	Protocolo 1000 antes de la exposición a la altura es mejor, pero a la aparición repentina administrar el Protocolo 6 y 6 y luego ir al Protocolo 1000
Malaria	Dar dosis de 15 gotas, y luego esperar de 1 a 4 horas y dar otra dosis de 15 gotas
Mesotelioma	Protocolo 2000, Protocolo 3000, terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas y respirar suavemente), Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
Migraña	Protocolo 6 y 6, luego Protocolo 1000
Mononucleosis	Protocolo 1000
Neumonía	Protocolo 1000, terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
Osteoartritis	Protocolo 1000, Protocolo 3000
Osteomielitis	Protocolo 1000, Protocolo de bolsa
Osteoporosis	Protocolo 1000
Picazón	Protocolo de botella de spray
Polio	Protocolo 1000
Problemas de los ojos	Activar 4 gotas de MMS y añadir agua 1/2 taza. Use un gotero para poner unas gotas en cada ojo cada hora durante 10 horas, Protocolo 1000
Psoriasis	Protocolo 1000, Protocolo de bolsa, Protocolo de baño
Quemadura del sol	Protocolo de botella de spray una vez por hora
Quemaduras	Se aplica directamente sin activar MMS y se dejan sólo de 3-5 minutos, luego enjuague. Si no entiende alguna parte de “enjuague”, entonces no lo haga.

Quiste de ovario	Protocolo 1000, Protocolo de ducha
Rosácea	Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray
Sangrado uterino disfuncional	Protocolo 1000, Protocolo de ducha
Sífilis	Protocolo 1000, Protocolo de ducha para las mujeres, Protocolo de botella de spray
Síndrome de Asperger	Protocolo 1000
Síndrome de Down	Protocolo 1000
Síndrome de Piernas Inquietas	Protocolo 1000
Síndrome del Intestino Irritable	Protocolo 1000, Protocolo de enema
Síndrome del túnel carpiano	Protocolo 1000, aplicación de Protocolo 3000 en la zona afectada 1-3 veces por día
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)	Protocolo 6 y 6, a continuación, Protocolo 1000, terapia de inhalación (no usar más de 2 gotas activadas y respirar suavemente)
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)	Protocolo 1000
Tiña	Protocolo 1000, Protocolo de gas (Active 6 gotas de MMS en un vaso transparente y ubique la boca del vaso sobre la llaga del lado derecho, de tal manera que el líquido no toque la piel. Deje en ese lugar 5 minutos y no más. Cubrir con vaselina y una venda y esperar por lo menos 4 horas antes de hacerlo otra vez.)
Trastorno bipolar	Protocolo 1000
Trastorno de Ansiedad Generalizada	Protocolo 1000
Trastornos de la alimentación	Protocolo 1000
Trombosis Venosa Profunda	Protocolo 1000
Tuberculosis (TB)	Protocolo 1000, Protocolo de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)
Tumores cerebrales	Protocolos 2000 y 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa, Protocolo de enema, terapia de inhalación (no usar más de dos gotas de MMS activado y respirar suavemente)

Úlceras	Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray para las úlceras de la piel, Protocolo gas para las úlceras de la piel (Active 6 gotas de MMS en un vaso transparente y ubique la boca del vaso sobre la llaga del lado derecho, de tal manera que el líquido no toque la piel. Dejar en ese lugar 5 minutos y no más. Cubrir con vaselina y una venda y esperar por lo menos 4 horas antes de hacerlo de nuevo.)
Úlceras pépticas	Protocolo 1000
Urticaria	Protocolo 1000, Protocolo botella de spray, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
Verrugas genitales	Protocolo 1000, Protocolo de botella de spray, Protocolo de ducha
Vértigo	Protocolo 1000, mezcla 4 gotas de MMS activado en 1/2 taza de agua y colocar de 3 a 4 gotas en los oídos cada hora, mientras que se sienta de costado durante 5 minutos (cubra y guarde la solución a utilizar durante todo el día)
VIH / SIDA	Protocolo 2000, Protocolo 3000, Protocolo de baño, Protocolo de bolsa
Viruela	Protocolo 1000

Algunas Situaciones Comunes

Asma, problemas del corazón, diabetes, epilepsia: Protocolo 1000

Problemas graves: Protocolo 1000

Cáncer: Protocolo 2000, es tomar MMS1 cada hora, 10 horas al día, pero usando tantas gotas por hora como pueda aguantar sin sentir náuseas, diarrea o fatiga severa. También tomar MMS2 cada 2 horas el mismo tiempo hasta estar bien. Ver capítulo 13, (Protocolo 2000). En casos en los que el cáncer está especialmente mal, también sumar el Protocolo 3000.

Niños y bebés: Usar media gota por hora, hasta 7 kg de peso corporal. Usar una gota por hora para más de 7 kg y cada 12 kg de peso corporal. Usar Protocolo 1000 o seguir instrucciones para Protocolo 2000 para cáncer y otras enfermedades amenazantes. Para el Protocolo 2000 es lo mismo –usar tanto MMS como sea posible sin hacer que el niño se enferme.

Diarrea no causada por MMS: Protocolo 1000 (3 gotas por hora). Si la diarrea no es causada por el MMS, espere hasta que se vaya. Beba mucha cantidad de agua.

Dolor de oídos: Para un dolor de oídos, ponga 4 gotas en medio vaso de agua. Acuéstese de costado, llene el oído con el líquido y sáquelo para que el líquido llegue hasta el fondo.

Infecciones de ojos: Prepare una dosis de 4 gotas en medio vaso de agua, luego use de 1 a 4 gotas en los ojos 4 veces al día. También agregue el Protocolo 1000 para un mejor tratamiento de infecciones de ojos.

Gripe: Dosis de 3 gotas cada hora hasta estar bien. Reduzca el número de gotas si ocurre náusea e increméntelas cuando la náusea se detenga. (Protocolo 1000)

Presión alta: Dosis de 3 gotas cada hora. Reduzca el número de gotas si ocurre náusea e increméntelas cuando la náusea se detenga. Continúe una semana después de sentirse bien. (Protocolo 1000)

HIV y SIDA: Tome dosis de 3 gotas cada hora y reduzca el número de gotas si ocurre náusea. Incremente el número de gotas si la náusea se detiene. Continúe durante 3 semanas. (Protocolo 1000)

Problemas graves de enfermedades incurables: Usar el protocolo de cáncer. (Protocolo 2000)

Mantenimiento: Gente mayor (de más de 60 años) usar de 4 a 6 gotas por día. Gente más joven usar 4 gotas dos veces por semana.

Malaria: Para malaria, dar una dosis de 15 gotas, espere una hora, de una segunda dosis de 15 gotas, luego de 6 gotas cada hora hasta sentirse bien.

Malaria y prevención del cáncer: Use 4 gotas por día de por vida.

Problemas regulares: Use 4 gotas 4 veces al día.

Problemas de nariz y nasales: Prepare una dosis de 6 gotas en medio vaso de agua. Acuéstese y ponga 6 gotas en cada fosa nasal cada pocas horas hasta mejorar. O use un litro de agua con 32 gotas de MMS activado. Apoye de costado su cabeza en el fregadero y con una botella de agua caliente, use una manguera para drenar el agua dentro de la fosa nasal superior y dejando que salga por la fosa nasal inferior. Luego de vuelta su cabeza y haga lo mismo del otro lado.

Congestión nasal: 4 gotas en medio vaso de agua. Apóyese sobre su espalda y ponga varias gotas en cada fosa nasal, o drene varios vasos hasta un litro a través de una fosa nasal y de la otra 4 o 5 veces diariamente hasta que la congestión nasal se haya ido.

Problemas pequeños: Use 6 gotas dos veces al día.

Llagas y erupciones en la piel: Use 20 gotas de MMS activado y agregue justo una cuarta parte de un vaso de agua. (Eso son 10 gotas de MMS activado por onza de agua, la misma proporción de todos los rociadores para el cuerpo.) Rocíe sobre la piel afectada o aplíquelo con sus dedos. Haga esto 4 veces al día o cada hora si es necesario. También use el Protocolo 1000.

Llaga en la garganta: Gárgaras con dosis de 6 gotas en medio vaso de agua cada 2 horas. Tome dosis de 3 gotas cada hora hasta mejorar. (Protocolo 1000).

Llagas en la cabeza: Use una dosis de 10 gotas y un octavo de un vaso de agua (10 gotas activadas por onza de agua lo cual es la misma proporción de todos los rociadores para el cuerpo). Rocíar o aplicar sobre la llaga 4 veces al día.

Infección de estafilococos: Usar 5 o 6 gotas y activar en un envase lo suficientemente ancho como para cubrir la infección. No usar agua, sólo el gas, pero nunca más de 5 minutos. 10 minutos le hará una quemadura. Ubique su cuerpo de forma que el líquido no se derrame –mantenga el envase en la superficie inferior o lateral de una parte del cuerpo. La infección de estafilococos debería morir después de uno o dos tratamientos. Espere 4 horas antes de aplicar el segundo tratamiento. (Si usa un envase de vidrio por el cual pueda ver usted a través de él, será capaz de ver los estafilococos siendo destruidos.)

Dolor de dentadura o problemas de la boca: Prepare una dosis de 10 gotas en medio vaso de agua. Cepille sus dientes y encías cada hora hasta que el dolor de dentadura se haya ido y luego dos veces al día hasta que su boca y encías estén totalmente sanas.

Otros problemas y enfermedades del cuerpo: Por supuesto no hay suficiente lugar en este libro para listar todos los problemas del cuerpo y enfermedades, pero por favor use la lista de problemas arriba detallada para guiarse en el tratamiento de sus problemas individuales, y por supuesto vea todas las instrucciones de este libro.

PROTOCOLO 1000

El Protocolo 1000 es básicamente tomar 3 gotas de MMS activado cada hora, durante 8 horas cada día, durante 3 semanas. Sin embargo, mucha gente no puede empezar tomando tantas gotas y debe comenzar con solo 2 o incluso con 1 gota por hora. Esto se determina por lo enfermas están, para saber con cuánto comenzar. Si uno se está sintiendo muy enfermo entonces empezar con 1 gota por hora o incluso $\frac{1}{2}$ gota por hora, para entonces comenzar a tomar más si usted siente que puede. La regla es, si siente que las gotas lo están haciendo sentirse peor, tome menos y no le hacen sentirse peor entonces tome un poco más a la siguiente hora, pero nunca más de 3 gotas por hora.

La forma en la que usted produce la activación puede ser de 4 formas diferentes, cualquiera de estos métodos es aceptable: Primero, agregue el número de gotas de MMS a un vaso de vidrio limpio, luego actívelo como sigue:

- (1) (Método preferido) Agregue 1 gota de ácido cítrico 50% por cada gota de MMS que esté en su vaso, agite para mezclar, espere 20 segundos, agregue, agregue entre $\frac{1}{2}$ vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.
- (2) Agregue 5 gotas de ácido cítrico 10% por cada gota de MMS en el vaso, y luego agite para mezclar, espere 3 minutos, agregue entre medio vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.
- (3) Agregue 5 gotas de vinagre por cada gota de MMS en el caso, agite para mezclar, espere 3 minutos, agregue entre medio vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.
- (4) Agregue 5 gotas de jugo de limón recién exprimido por cada gota de MMS en el vaso, agite para mezclar, espere 3 minutos, agregue entre medio vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.

No use jugo de naranja. No utilice jugos que contengan vitamina C o ácido ascórbico. No use jugos concentrados que haya que agregarles agua. Jugos frescos es lo mejor.

Pero si no quiere preparar dosis por dosis a cada hora, puede preparar 8 dosis a la mañana, y guardar la solución en un envase cerrado todo el día. Solo siga las instrucciones arriba descriptas multiplicando por 8 cada número, luego ponga en líquido en un envase cerrado. Tome $\frac{1}{8}$ de ello cada hora. No se preocupe, el MMS durará más horas de lo que se necesita.

Ahora, estas son las instrucciones importantes de las cuales debe estar seguro que va a seguir: Usted no debe enfermarse más a sí mismo de lo que ya está: No se cause a sí mismo mucha náusea, ni dolor, ni diarrea. Cuando advierta que alguno de estos síntomas llega tome menos MMS. Trate de no parar de tomar MMS, sólo tome menos. Vaya de 2 gotas por hora de MMS activado a 1 gota por hora. O si usted ya estaba en 1 gota por hora, entonces tome $\frac{1}{2}$ gota por hora, o incluso $\frac{1}{4}$ gota por hora. No se cause a sí mismo diarrea si puede evitarlo tomando menos MMS. El dolor, la diarrea, la náusea y otras molestias causan pérdida de energía, que al final causan una curación más lenta y una recuperación más lenta. Por otra parte, trate de

incrementar la cantidad de gotas que está tomando hasta tomar 3 gotas por hora, pero no vaya a más de 3 gotas por hora. CONTINUE ASÍ HASTA MEJORAR.

Aquí está cómo llevar su dosis de 8 horas con usted en lugar de tener que activarla a cada hora.

Tome una botella de litro, divídala en 8 partes iguales. Mezcle 24 gotas de MMS y 24 gotas de ácido cítrico al 50%. Agite o mezcle unos 20 segundos. Llene la botella con agua y tendrá 3 gotas de MMS activado por división tomada por hora.

NOTA: Esta botella activada de MMS durará hasta 5 días en el congelador. Hemos descubierto que después de que usted activa el MMS, mientras no entre en contacto con un patógeno, el dióxido de cloro no se libera.

Protocolo 1000

El Nuevo Protocolo MMS 1000



Como prepararlo de manera práctica:

Vacié una botella de agua mineral de ½ litro (pero guarde el agua) escurra bien el recipiente hasta este seco. Ponga 12 gotas de MMS y actíVELO con otras 12 gotas de ácido cítrico adentro. Espere hasta que se vuelve amarillo ámbar 1-2 min. Entonces llene la botella con su agua mineral y listo para tomar.

El primer día tome 1 botella y a partir del segundo día 2 repartidos en sorbos iguales cada hora aproximadamente. En caso de malestar o náusea reduzca la dosis hasta sentirse bien.

MMS en la dosis correcta aporta más energía al cuerpo. El paciente nota una mejora en muy poco tiempo. Sobredosis pueden producir cansancio y incluso algo de náuseas. Cada cuerpo necesita un tiempo de adaptación diferente así que escuche a su cuerpo (;y a nadie más!). Esto es debido a que hay diferentes pesos, grados de enfermedad y edades. La regla general es:

- cuando peor se encuentra la dosis mas lenta

recuerde:

- *Tome las gotas del MMS activado en zumo o agua una vez cada hora durante por lo menos 8 horas consecutivas al día durante 3 semanas.*
- *Normalmente es mejor empezar por tomar el primer día tome 1 botella y a partir del segundo día 2 botellas de 1/2 litro.*
- *Para una persona muy enferma, lo mejor es empezar con media gota por hora durante las primeras horas.*
- *Aumente el número de gotas por hora cuando la persona sea capaz de tolerar más, pero nunca pase de 3 gotas por hora.*
- *En caso de vómito o diarrea parecen extremos, deje las dosis cada hora hasta que se encuentre mejor y empiece otra vez, pero a una dosis reducida.*
- *En caso de náuseas inmediatamente reducir la dosis, pero no deje de tomar MMS a menos que la náusea es severa.*

No use zumo de naranja, pero la mayoría de otros zumos están bien, siempre y cuando no tengan vitamina C o otros antioxidantes añadidos. El zumo de naranja y la vitamina C añadida para impiden la acción del MMS.

Lidiando con Náuseas, etc.

Si usted notaria náusea, vómito, diarrea o cansancio, beba un vaso de agua o tome una cucharadita de bicarbonato de sodio o AlkaSeltzer. Si esto no funciona, detenga el tratamiento hasta que el problema se haya ido, y luego continúe con menos MMS por unas horas. Pero vuelva a las 3 gotas por hora tan pronto como sea posible. Sólo pare en caso de náuseas hasta que ésta u otros problemas se hayan ido y luego continúe con una dosis menor.

Estas reacciones en el cuerpo son indicios de que el MMS está trabajando, pero que ha tomado más del que su cuerpo pueda manejar cómodamente.

PROTOCOLO 2000

Es para cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida. Básicamente es tomar tantas gotas de MMS **activado** por hora como pueda un persona tomar sin enfermarse ni sentirse peor, ni tener diarrea. Debe hacerse durante 10 horas por día, durante 3 semanas o hasta mejorar. Es mejor empezar con sólo 1 gota por hora y rápidamente alcanzar tantas gotas como pueda, otra vez déjeme decir que sin sentirse peor. Recuerde que todas las gotas deben ser activadas tal como se indica a continuación. Por favor, tome esto de corazón, no se enferme a usted mismo más de lo que ya está. Tome tantas gotas como usted pueda, pero dosis fácil. Enfermándose a usted mismo gasta energías que hace que la recuperación sea más lenta.

La forma en la que usted produce la activación puede ser de 4 formas diferentes, cualquiera de estos métodos es aceptable: Primero, agregue el número de gotas de MMS a un vaso de vidrio limpio, luego actívelo como sigue:

- (5) (Método preferido) Agregue 1 gota de ácido cítrico 50% por cada gota de MMS que esté en su vaso, agite para mezclar, espere 20 segundos, agregue, agregue entre $\frac{1}{2}$ vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.
- (6) Agregue 5 gotas de ácido cítrico 10% por cada gota de MMS en el vaso, y luego agite para mezclar, espere 3 minutos, agregue entre medio vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.
- (7) Agregue 5 gotas de vinagre por cada gota de MMS en el caso, agite para mezclar, espere 3 minutos, agregue entre medio vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.
- (8) Agregue 5 gotas de jugo de limón recién exprimido por cada gota de MMS en el vaso, agite para mezclar, espere 3 minutos, agregue entre medio vaso y vaso entero de agua o jugo y beba.

No use jugo de naranja. No utilice jugos que contengan vitamina C o ácido ascórbico. No use jugos concentrados que haya que agregarles agua. Jugos frescos es lo mejor.

Pero si usted no quiere preparar una dosis a cada hora, puede preparar 10 dosis a la mañana, y guardar la solución en un envase cerrado todo el día. Solo siga las instrucciones arriba descritas multiplicando todos los números por 10 y luego ponga el líquido en un envase cerrado. Tome un 1/10 a cada hora. No se preocupe por el MMS, durará más horas de las que se necesite mientras lo tape con fuerza.

Ahora, estas son las instrucciones importantes que debe asegurarse de seguir: No debe enfermarse a usted mismo más de lo que ya está: No se cause mucha náusea, ni dolor, ni diarrea. Cuando advierta que alguno de estos síntomas llega, tome menos MMS. Trate de parar de tomar MMS, sólo tome menos. Vaya de 2 gotas por hora de MMS activado hasta una gota por hora. O si ya estaba tomando sólo una gota por hora, entonces tome $\frac{1}{2}$ gota por hora, o incluso $\frac{1}{4}$ de gota por hora. No se cause diarrea si puede evitarlo tomando menos MMS. **El dolor, la diarrea, la náusea y otras molestias causan pérdida de energía, lo que al final causa una curación más lenta y una recuperación más lenta.** Por otra parte trate de aumentar la cantidad de gotas que está tomando hasta tomar tantas gotas por hora como pueda sin sentirse peor, pero nunca vaya a más de 12 gotas por hora.

Después de 3 días debe agregar MMS2. La manera de tomar el MMS2 es tomar 1 cápsula hora por medio, o para decirlo de una forma diferente, tome 1 cápsula cada 2 horas. SIN EMBARGO, empiece con $\frac{1}{4}$ de cápsula para el primer día y vaya a $\frac{1}{2}$ cápsula el segundo día, y entonces 1 cápsula entera de ahí en más. Así estará tomando 5 cápsulas por día. El primer día abra la cápsula y derrame $\frac{3}{4}$ de la cápsula cada vez y luego al otro día derrame sólo $\frac{1}{2}$ de la cápsula.

Este protocolo es para todos los tipos de cáncer y enfermedades que amenazen la vida, no importa qué tipo incluyendo Alzheimer.

MMS2 es hipoclorito de calcio en polvo en cápsulas de gel tamaño cero, comprado en una tienda de artículos para piscinas. No use hipoclorito de sodio. El hipoclorito de calcio se convierte en ácido hipocloroso cuando se disuelve en agua, contrariamente a la creencia de que no hay cloro disponible en este producto químico, independientemente de lo que diga en la etiqueta. Utilice polvo con concentración del 65%. Llene las cápsulas pero no las

concentre. El hipoclorito de calcio se vuelve ácido hipocloroso el cual es usado por el cuerpo para matar microorganismos, siga las instrucciones.

PROTOCOLO 3000

El Protocolo 3000 a menudo es confundido con el protocolo de la botella MMS para aplicación externa del MMS. El protocolo 3000 es usado para permitir que el MMS se use con DMSO (dimetilsulfóxido) y sea absorbido a través de la piel penetrando tumores entrando en la sangre e incluso penetrando el hueso.

El objetivo con situaciones que amenazan la vida es rápidamente conseguir que el MMS circule en la sangre mientras se trata de permanecer en un nivel bajo de náuseas. Una forma de alcanzar esto es agregando DMSO al MMS activado, así puede actuar como un transporte para enviar el MMS directamente dentro de la piel y los músculos, y en consecuencia a la sangre. La experiencia y las pruebas han probado que el DMSO es transportado directamente a cualquier cáncer en el cuerpo y penetra entonces en las células cancerígenas.

Esto no es una especulación, ha sido probado en las pruebas. La teoría es que cuando el DMSO transporta el MMS, lo llevará dentro de las células cancerosas, de este modo mata los virus que fabrican las células cancerosas. Muchos cánceres han sido curados de esta forma, y he escuchado sobre eso de mucha gente que me han telefoneado afirmando que su cáncer se ha ido.

- Cuando se usa este tratamiento, siempre también tomar MMS oralmente, como en los Protocolos 1000 y 2000.

Clara Beltrones en México ha usado el Protocolo 3000 bastante tiempo y ella ayudó a desarrollarlo. Junto con el Protocolo 2000, ella lo ha usado con muchos cánceres.

ADVERTENCIA DE ALERGIAS: Muy poca gente es alérgica al DMSO o han tenido hígados muy débiles y puede experimentar algunos problemas con el DMSO. Para probar si o no usted es alérgico a eso, realice este test:

- Cuidadosamente lave y seque su brazo,
- Agregue una gota de DMSO en un lugar de su brazo y frótelo,
- Dele cerca de 15 minutos para enjuagar y luego espere varias horas.

Si no hay dolor en el área de su hígado, probablemente es seguro para usted usar DMSO, lo cual sería el caso de 99 de 100 personas. Sin embargo, para estar seguro, espere 24 horas para asegurarse de que no tiene ninguna reacción al DMSO.

Si tiene una mala reacción al DMSO, usted necesita trabajar en mejorar su hígado. Comience tomando media gota de MMS1 cada hora usando el Protocolo 1000. Continúe con media gota hasta sentir que es seguro tomar más. Esto limpiará su hígado y probablemente otros problemas que usted tenga.

El tratamiento con MMS/DMSO descrito abajo es una técnica de piel usada para llevar el MMS adentro del plasma de la sangre. En caso de cáncer debería ser usado como agregado al régimen oral normal de MMS.

Pasos para proceder con DMSO

1. Prepare una solución de MMS activando 20 gotas de MMS con 20 gotas de ácido cítrico al 50% o 100 gotas de ácido cítrico al 10%. Espere 20 segundos para que active el ácido cítrico de 50% o 3 minutos para que active el ácido cítrico de 10%.

- Agregue esta solución a la onza de agua y luego rocíe o esparza algo de ello literalmente sobre un brazo. (Vea el paso número 4 debajo para gente más enferma).
2. En este punto, es mejor rociar 70% de DMSO sobre el MMS en la misma area y luego suavemente frotar y esparcirlo. Si usted mezcló antes el DMSO con el MMS, lo cual es práctico a veces, tendrá una vida útil de cerca de 6 horas solamente. Usted puede poner una bolsa de plástico sobre su mano para frotar la solución dentro de su cuerpo, o sólo puede usar sus manos desnudas.
 - No use guantes de goma u otros guantes médicos. Podría introducir la goma en su cuerpo ya que el DMSO derrite la goma.
 - Si advierte una sensación de quemazón, la mejor técnica es ubicar una cucharadita de agua sobre el área que quema y frotarla. Manténgala hasta que ya no queme.
 - Puede frotar aceite de oliva y jugo de aloe vera sobre la piel después de aplicar DMSO. Use una parte diferente del cuerpo cada vez que aplica la combinación MMS/DMSO. Más de 8 horas, use un brazo primero, luego el otro brazo, luego una pierna, luego la otra pierna, luego su estómago, luego vuelva a su primer brazo.
 - Si la quemazón es severa, agregue agua destilada al DMSO hasta 50% y más, y también al MMS, ya que puede ser que uno u otro cause la quemazón. Agregue suficiente agua destilada así no ocurre la quemazón.
 3. Repita este proceso una vez cada hora el primer día, y una vez cada hora el segundo y tercer día. Luego deje 4 días y haga lo mismo a la otra semana. Recuerde, cuando deja los 4 días, siga tomando MMS oralmente.
Después de la segunda semana puede ir por 4 días a la semana si no hubo problema con su piel.
 4. Para gente más enferma que debería tomar dosis más pequeñas, sería lo mejor empezar usando solo una pequeña area del cuerpo. Sugiero que use un área del tamaño de la palma de la mano, no más grande. Use un area pequeña así durante varios días antes de ir a un área más grande como un brazo o una pierna entera. Use un área más grande solo si no hay una mala reacción en un área más pequeña. O en su lugar, use el truco del agua destilada agregada mencionado más arriba.
El DMSO es una sustancia bien conocida como transporte usada ampliamente por doctores desde 1955 como una forma de transportar medicamentos directamente a dentro de la piel. Está disponible en droguerías y tiendas de comida saludable en la mayoría de los estados y también en internet, y en tiendas de artículos para animales. En internet, busque por DMSO.
Antes de escribir al Instituto MMS o a JimHumble sobre alguna consulta de una enfermedad específica, por favor visite la base de conocimiento www.mmsAnswers.org y clickée en varias enfermedades que pueden ser de interés. Una dirección de correo electrónico de contacto hay ahí si no puede encontrar la respuesta. Pero no use protocolos más viejos de los que hay ahí, asegúrese de usar los protocolos dados en este libro. (Nuestros websites son actualizados y mejorados durante 2011.)
NOTA: Cada vez que se mencionan las gotas de MMS, se trata de gotas activadas. Usted puede hacer MMS activado de dos formas: usando ácido cítrico al 50% o ácido cítrico al 10%.

Protocolo 4000 MMS2

Quiero decirte que este es un protocolo bastante fantástico que hemos usado durante un par de años. Finalmente Mark dice, “¿Por qué no presentamos este protocolo al público?” Eso tiene tanto sentido que me pregunto por qué no lo hicimos mucho antes.

Este protocolo es fantástico en que parece funcionar casi tan bien como el MMS1 en algunas enfermedades, idénticamente también en muchas, y mejor que el MMS1 en al menos un cosa –problemas de próstata, ya sea cáncer u otros problemas de próstata. (Tenemos algunos testimonios de haber eliminado Diabetes sólo con MMS2).

El MMS2 ha sido usado para ayudar a manejar el cáncer por varios años ahora y ha sido muy exitoso. En el protocolo actual de cáncer (Protocolo 2000), se da 5 veces al día. En Malawi, cuando nos quedamos sin MMS1, tuve gente que tomaba una cápsula de gel tamaño cero con MMS2 5 veces al día para tratar la situación del HIV, y funcionó. Lo usamos exitosamente en alrededor de 200 personas en Malawi pero también en cientos de personas antes de que estuviera en Malawi y recientemente en la República Dominicana.

El MMS2 ha sido usado para curar cientos de diferentes enfermedades. Tiene una alta probabilidad de curar cualquier enfermedad que usted tenga.

Este protocolo es fantástico porque permite a casi cualquiera en el mundo tener en sus manos un MMS asesino muy rápidamente y barato. Pero normalmente, no recomiendo usarlo para reemplazar el MMS1. Sólo úselo cuando no pueda encontrar MMS1.

¿Qué es el MMS2?

Como muchos ya saben, el MMS2 es hipoclorito de calcio. Si aún no sabe esto, puede sorprenderlo un poco porque el hipoclorito de calcio es para tratar piscinas. Lo llaman “shock” de piscina y se vende en todo el mundo para tratar piscinas. La gente rica suelen tener piscinas –son un símbolo de ser rico en la mayoría de los países. Así que el hipoclorito de calcio está disponible en todas partes. Cuando lo compras, el paquete dirá “65% de cloro activo”, o 68%, o 75%, o incluso 80% de cloro disponible. Bien, químicamente eso no es cierto.

No hay cloro disponible en el hipoclorito de calcio y nunca se hace cloro disponible para su uso.

Lo que hace es cambiar a ácido hipocloroso a medida que se disuelve en agua. Entonces mata patógenos en la piscina y los matará en tu cuerpo del mismo modo. No hay duda de que si en lugar de decir “cloro activo” hubiera dicho “ácido hipocloroso” venderían muy poco de este producto, porque todos ya saben que el cloro mata patógenos, y poca gente ha escuchado del ácido hipocloroso.

El hipoclorito de calcio está en supermercados en muchas partes del mundo desde que los supermercados tienen sector de piscinas si la ciudad es lo suficientemente grande como para tener su propia tienda de piscina.

Recuerde que:

Todos los químicos conocidos por el hombre son venenosos en grandes cantidades incluyendo la sal.

Si observa un diccionario químico, verá que la mayoría de los químicos listados son considerados tóxicos en grandes cantidades, y que la mayoría de ellos son usados en medicina. Cada químico debe ser usado en la cantidad correcta para el trabajo que se intenta hacer. Eso sólo lógica estándar y así es como usamos hipoclorito de calcio, en las justas medidas para hacer el trabajo.

Espere las Críticas Usuales

Déjeme decirle aquí y ahora que habrá críticos usuales que son o bien pagados por compañías farmacéuticas o bien alguien celoso de ver que haya alguien que ayuda al pobre y al enfermo a estar bien. Serán:

1. Afirmar que el MMS2 es cloro, un químico tóxico conocido; y
2. Citar lo que el cloro hace en grandes cantidades, nunca mencionar que puede hacer en las pequeñas cantidades que usamos.

Le digo esto de entrada así se prepara para lo que digan. No habrá lógica en sus gritos, sólo celos estándar –o de los que son pagados por estos que lucran con la enfermedad y la muerte.

Una vez que explicas que el hipoclorito de calcio crea ácido hipocloroso, se irán, luego volverán y tratarán de decir que el ácido hipocloroso libera cloro. Es todo parte de un esfuerzo mundial para mantener al público ignorante de la verdad. Los hechos son:

El ácido hipocloroso libera átomos de oxígeno que destruyen a los patógenos.

El ácido hipocloroso libera cloro sólo en forma de sal de mesa.

Si tuvieran razón y el ácido hipocloroso liberara cloro, entonces usted olería a cloro en cada persona que usted encuentre porque el cuerpo humano produce ácido hipocloroso continuamente.

El Porcentaje de ácido hipocloroso disponible

Al comprar hipoclorito de calcio, si el paquete dice “68% cloro activo” en que en realidad significa que el 68% del ácido hipocloroso será creado cuando se disuelva en agua. Ahora esto es importante.

El sistema inmunológico humano ha usado ácido hipocloroso para matar patógenos por miles de años.

El ácido hipocloroso matará casi todas las enfermedades –por eso lo usan en piscinas. Pero otra vez, también matará estas enfermedades en tu cuerpo. Dios eligió este químico porque mata muchas enfermedades diferentes así. La tienda puede que no le ofrezca una gran variedad de porcentajes, pero casi cualquier porcentaje entre 40% y 85% de “cloro activo” está bien. En 40%, podría tomar dos cápsulas para igualar a una cápsula al 80%. Otra vez:

Cuando se habla de cloro disponible en el hipoclorito de calcio, en realidad es ácido hipocloroso.

¿No cree que es divertido que aunque se haya sabido durante cien años que el ácido hipocloroso es usado por el sistema inmunológico para matar la mayoría de las enfermedades, y que se haya sabido que el sistema inmunológico necesita este ácido, que los médicos nunca pensaron en dar algo de ácido hipocloroso extra a los enfermos para probar si podría ayudar? Bien, ayuda tremendamente, pero los médicos nunca lo han usado.

Cuando usted va a una tienda de piscinas y compra un poco de hipoclorito de calcio, no se preocupe por los otros químicos que están en los gránulos del hipoclorito de calcio. No pueden ser tóxicos porque si lo fueran, miles de nadadores se hubieran intoxicado. Desafortunadamente, no hay hipoclorito de calcio de grado alimenticio disponible en el mundo. Estamos limitados a comprarlos en tiendas de piscinas, pero aun podemos salvar millones de vidas.

La piel humana es el órgano más grande del cuerpo y absorbe más cosas que el estómago humano. Así que lo que es seguro para la piel del cuerpo entero es seguro para el estómago. Volviendo al 2005, personalmente yo he tomado hipoclorito de calcio durante meses antes de dárselo a alguien más y desde entonces, se lo he dado a cientos de personas.

¡No compre hipoclorito de sodio! Es diferente del hipoclorito de calcio, lo que en realidad le causará estar tomando cloro y eso lo enfermará.

Hipoclorito de Calcio (MMS2) Información de Cura

Si usted toma demasiado hipoclorito de calcio se causará una reacción Herxheimer. La reacción Herxheimer significa náuseas o enfermedad causada por matar patógenos demasiado rápido. Cuando un patógeno muere, a menudo suelta veneno dentro de su sistema lo cual puede enfermarlo si ha matado demasiados al mismo tiempo. Se ha demostrado una y otra vez que una persona así sin patógenos nunca se enfermará por tomar MMS2 en la cantidad que nosotros usamos –así si se enferma por tomar nuestras cantidades, significa que está matando patógenos.

En ese sentido, una reacción Herxheimer es buena señal, señal de que el MMS2 está haciendo su trabajo. Pero usted debe reducir inmediatamente la dosis porque sentirse mal y vomitar consume energía para curarse y hace más lenta la recuperación. Normalmente, una cápsula completa cada 2 horas lo hará mejorar sin causar una reacción Herxheimer (nausea o diarrea). Puede tomar menos abriendo la cápsula y quitando algunos gránulos. Puede quitar 50% de ello, o más, si lo necesita.

Recuerde, no importa si la llaman cloro de piscina, o shock de piscina, o de otra manera. Debe ser el químico hipoclorito de calcio del 40% al 85% y por supuesto, 85% es por lejos el mejor. Eso significa que el paquete dirá 40% (o 50% o 60% o 70% o más porcentaje) que es “cloro activo”, que, déjeme repetir, **no es cierto**. En realidad es ácido hipocloroso que está disponible cuando se disuelve en agua.

Hay un lugar en el mundo donde se fabrica hipoclorito de calcio al 100%. Ese sería el mejor, pero cualquiera de los otros porcentajes menores funcionarán. Lo que usted quiere y lo que consigue de este químico, el hipoclorito de calcio, es ácido hipocloroso –el mismo que su cuerpo produce para matar enfermedades. La naturaleza simplemente no proveyó suficiente ácido hipocloroso para tratar las enfermedades realmente malas.

¿Qué pasa si está asustado?

Bien, por supuesto, no lo culpo. Si no ha visto a personas mejorar con esta técnica, es razonable estar asustado. Usted está enfermo y acá hay un tipo sugiriéndole que tome “shock” de piscina. Antes que nada, recuerde que JimHumble no gana un centavo por decirle esto. No hay forma de que las tiendas de piscina del mundo paguen a JimHumble – de hecho, más bien dirían que estoy loco.

Si usted les dice para qué va a comprar el hipoclorito de calcio no se lo venderán.

JimHumble sólo quiere que la humanidad mejore. Ese es nuestro trabajo.

Aquí comenzamos

1. Compre algunas cápsulas. No pueden hacerle mal. Millones de personas las toman cada año. Preferentemente cómprelas en tamaños menores de 00.
2. Ponga un simple gránulo en una cápsula y tómela. O use la técnica de miel dada más adelante en este boletín de noticias para un gránulo. Un simple gránulo no puede ayudarlo, pero no puede hacer mal tampoco. Esta es la forma en la que hago esto. Tomo una pequeña dosis en la primera vez que no puede hacerme mal, no importa qué. Luego incremento mi dosis lentamente. Pruébelo. Es seguro. Si usted ha bebido agua de ciudad, lo más probable es que ya ha bebido más de un gránulo en un vaso de agua.
3. Siga tomando una cápsula cada dos horas e incremente el número de gránulos cada vez. Cada vez que lo sienta, pare y espere hasta el otro día para continuar. Solo siga incrementando hasta seguir el protocolo dado más abajo.

Protocolo 4000 – MMS2 para adultos y niños

Si tiene alguna enfermedad, incluyendo gripe porcina o cualquier otra enfermedad común o cualquiera de las enfermedades “incurables”, este protocolo puede curarlo. Si no nota una buena mejora en dos semanas, debería pasar el Protocolo 2000 (ver www.mmsargentina.wordpress.com). Si nota alguna mejora, debería continuar con este protocolo.

Lo básico de este protocolo es que adultos o niños tomen MMS2 cada 2 horas todo el día durante 12 horas. Por supuesto, los niños toman menos que los adultos. Si no tiene cápsulas, vea la técnica de la miel dada más abajo.

PASO 1. Cantidad de MMS2 a tomar cada 2 horas

En cada caso, he dado varias maneras diferentes para determinar la correcta cantidad de tomar. Es de esperar que lo haga bien. Tenga en cuenta sin embargo que no tiene por qué ser un problema que usted esté un poco afuera del tema. Si empieza a notar náuseas, reduzca la dosis horaria en 25% al menos y siga reduciéndola tanto como sea mientras note náusea u otro malestar. Pero siempre incremente otra vez a la dosis recomendada tan pronto como se sienta seguro de hacerlo. Si siente que se beneficiaría un poco más, incremente su dosis en 25% por una vez o dos, pero no mucho más de eso.

Altas Dosis No Es Necesariamente Útil

Siempre tenga en cuenta que causarse náusea o diarrea por tomar un poco más no ayudará a que se cure más rápido. La náusea o la diarrea consume energía de curación y hace que sea más lenta la sanación. Siempre reduzca lo que toma si nota náusea o diarrea, o para el caso, o cualquier otro malestar causado por el MMS2.

El MMS2 no causará a ninguna persona sana ningún tipo de malestar en las cantidades que usamos. El sistema inmunológico le agradecerá el ácido hipocloroso extra.

El hipoclorito siempre huele a cloro, como muchos químicos de cloro, pero no se preocupe, ya que en realidad no es cloro.

Una persona de 90 kilos...

...tomaría un gramo de hipoclorito de calcio cada hora durante 12 horas. Podría ser:

- Una cápsula tamaño 00 completamente llena, o
- Media cucharadita de gránulos (en un par de cápsulas más pequeñas si no hay tamaño 00).

La mejor forma de conseguir exactitud en media cucharadita es llenar la cucharadita y desechando al ras de la superficie con un cuchillo para que quede exactamente llena. Luego poner la cucharadita en un plato y cuidadosamente dividirlo en dos montoncitos iguales. Ahora tiene media cucharadita en cada montón. La mayoría de la gente puede juzgar si dos montones son aproximadamente del mismo tamaño. Así es como hacemos nosotros las dosis correctas de hipoclorito aquí en República Dominicana. En este caso de un hombre de 90 kilos, debería usar sólo una de estos montoncitos para la dosis, la mitad de una cucharadita.

Siempre beba por lo menos 250 cc de agua con cada dosis de MMS2

Una persona de 73 kilos...

...tomaría 800 mg cada dos horas. Eso sería un tamaño cero (0) cada cápsula cada dos horas. O puede hacer una cucharadita completa como el ejemplo anterior, ponerlo en un plato, y cuidadosamente hace dos montones. Para aclarar la idea, llamemos a uno de estos montones, A y al otro B.

1. Ponga a un costado el montón A.
2. Divida el montón B en dos montoncitos iguales. Llamemos a estos dos montoncitos, B1 y B2.
3. Agregue el montón B1 al montón A, y divídalo a este montón en dos partes, y tendrá aproximadamente 750 mg que sería bastante cerca a una dosis para una persona de 73 kilos. Use un vaso de 250 cc de agua para bajarlo.

Una persona de 45 kilos...

...necesitaría dosis de 500 mg y eso podría ser 1 cápsula tamaño 1 cada dos horas. O seguir el ejemplo de más arriba, uno podría tomar una cucharadita al ras y dividirlo como se da arriba, y tomar el montón B1 el que por supuesto, sería igual a un cuarto de cucharadita y sería 500 mg para una persona de 45 kilos.

Siempre beba por lo menos un vaso de agua con cada dosis de MMS2

Un niño de 23 kg...

...necesitaría 250 mg cada dos horas. Otra vez, divida una cucharadita de hipoclorito como se da arriba. Significa que tomaría uno de los dos montoncitos B1 o B2 hechos del montón B, y divídalo en dos montoncitos iguales, que serían llamados B1a y B1b. Cada uno sería 250 mg o aproximadamente una cápsula de tamaño 2 cada 2 horas.

Siempre dé de beber al niño por lo menos 200 cc de agua con la dosis de MMS2.

Un niño de 11,5 kg...

...necesitaría 125 mg cada hora. Tome la mitad de lo que se da a un niño de 23 kg como dice arriba –eso sería una cápsula tamaño 3 cada dos horas. O podría tomar uno de los dos montones hechos en el ejemplo de arriba, que serían B1a o B1b, y dividirlo en dos partes (la mitad de B1a). Es aproximadamente 125 mg.

El niño debería beber aunque sea 125 cc de agua con la dosis de MMS2.

La Técnica de la Miel

...es para los que no tienen cápsulas o no pueden conseguirlas. Trate de conseguir un frasco de miel pura porque si tiene algún conservante, no va a funcionar. Normalmente, no tienen conservantes, pero quién sabe lo que hacen después y los conservantes anularán la importancia del hipoclorito de calcio. Pero si no hay miel pura disponible, una marca de buena calidad de un supermercado estaría bien.

Asegúrese de mirar la etiqueta para ver que no tenga conservantes ni vitamina C. La vitamina C natural que ya está en la miel no es un problema. La miel no necesita conservante y durará años o incluso décadas sola, pero mucha gente que usa miel no entiende eso.

Ponga la miel en el refrigerador. Es totalmente necesario que la miel esté tan fría como pueda un buen refrigerador. Luego mida la cantidad correcta de hipoclorito de calcio para su dosis de cada dos horas y mézclela dentro de una cantidad muy pequeña de miel muy fría del mismo tamaño que el montón de hipoclorito de calcio que usted tomará. No permita que el agua ni humedad se mezclen en él. Una vez que los haya mezclado, inmediatamente póngalo en la punta delantera de una cucharita y tómelo. Tome un vaso de agua ahí para bajarlo.

Debe bajar inmediatamente ya que tendrá un gusto terrible cuando empiece a calentarse.

Beba al menos un vaso lleno de agua. Si hace esto bien, no habrá ningún problema ni gusto.

Advertencia

No trate de usar miel a temperatura ambiente. No funcionará porque la miel comenzará una reacción con el hipoclorito de calcio inmediatamente y el gusto le impedirá hacerlo bajar por la garganta. Si no tiene un refrigerador, compre un poco de hielo y ponga el frasco de miel en agua helada. O mejor aún, coloque una pequeña cantidad de miel en una bolsa de plástico y póngala dentro del agua helada. Se enfriará mucho más rápido así.

La miel tiene que estar fría cuando se usa.

El agua es importante. La persona de 90 kilos, la de 73 kilos y la de 45 kilos deberían beber 250 cc de agua con la miel y la dosis de MMS2. Vea arriba para la cantidad de agua que debería tomar en cada dosis.

Para bebés, por favor mire www.jimhumble.biz

Paso 2. Procedimiento: Tome MMS2 cada 2 horas, 12 horas al día durante 3 semanas

No comience tomando la toda la cantidad como se recomienda arriba. Tome $\frac{1}{4}$ o menos de lo recomendado para empezar y en un día o dos, aumente la dosis a los que se recomienda arriba. Aumente un poco cada dos horas.

El hipoclorito siempre huele a cloro, pero no es cloro.

Puede ser que no tenga muchas cápsulas de gel de diferentes tamaños de donde elegir. Pero puede hacer cápsulas de gel tamaño 00 llenándolas con cantidades más pequeñas para cumplir con las recomendaciones. O podría conseguir cápsulas de tamaño más pequeño y llenarlas para alcanzar la cantidad de MMS2 recomendado. O usar la técnica de la miel explicada arriba.

No Haga Sobredosis

No se enferme a usted ni a otro usando demasiado MMS2. Debe ser cuidadoso. Desde el mismo principio, tenga cuidado de tomar demasiado MMS2. No se preocupe, nadie ha muerto, pero alguien puede sentir malestar durante algunas horas después de tomar demasiado.

Si alguien siente malestar o peor de lo que ya estaba, lo primero de sospechar es que no tomó suficiente agua con la(s) cápsula(s). El agua es importante para prevenir náuseas y otras reacciones como dolor de estómago. Siempre beba más agua si empieza a sentir náuseas. También da la sospecha de que tomó demasiado MMS2 (hipoclorito de calcio) y si el agua no detiene las náuseas inmediatamente, entonces tome menos en la siguiente dosis de cada dos horas. Pruebe bajando la dosis a la mitad la próxima vez.

Si aun se siente mal tomando la mitad de la dosis anterior, corte la dosis por la mitad otra vez. Puede terminar tomando una dosis minúscula, y tiene que tomar una dosis minúscula durante un día o dos, o incluso una semana. Pero continúe sin causarse malestar. Si las dosis pequeñas no causan náuseas ni otro malestar, aumente hasta la dosis completa en varios pasos como se da arriba.

Normalmente no vaya a dosis más grandes de las que sugerimos arriba, ya que más grandes no son necesarias.

La cantidad de tiempo requerido para curar varias enfermedades

Normalmente lleva de 3 a 5 semanas curar HIV, y eso también se aplica a la mayoría de las enfermedades incurables. Algunas enfermedades han calado muy profundo y pueden llevar más tiempo. La diabetes puede tomar entre una semana y un año, pero la mayoría de los casos se ha curado en 6 semanas o menos. Sea cual sea la enfermedad que usted tiene, nunca deje hasta que se haya curado y luego haga la dosis de mantenimiento.

Normalmente, siempre digo que sólo siga tomando MMS2 cada dos horas en el día (durante 12 horas) hasta que mejore.

Paso 3, Mantenimiento

Uno debería siempre continuar con una dosis de mantenimiento, ya que el cuerpo no fabrica suficiente ácido hipocloroso para matar todas las enfermedades. Si usted es mayor de 65 años y no está tomando 6 gotas de MMS1 diariamente, tome la mitad de una dosis de MMS2 cada día. Esta media dosis debería ser la mitad de una dosis de cada dos horas que usted estuvo tomando como se da arriba.

Así que, en este protocolo 4000 de MMS2, usted estará tomando 42 dosis por semana y cuando tome las dosis de mantenimiento estará tomando siete medias dosis por semana. Si prefiere, podría cambiar a usar 6 gotas de MMS1 una vez al día si tiene MMS1.

Por favor, guarde este boletín porque incluso si usted no lo usa ahora, podría salvar la vida de alguien en algún momento en el futuro.

Protocolo para baño

Nuestra piel es un órgano totalmente permeable que posee la capacidad de actuar como una membrana osmótica, permitiendo que se produzca un intercambio entre el interior de nuestro cuerpo y el exterior. Además de las conocidas tomas de dosis orales es posible absorber por la piel directamente MMS. Una cantidad mayor de ClO₂ es puesta en circulación y las ventajas, según la experiencia de quienes lo han utilizado, son bastante rápidas, sobre todo combinado con otros protocolos. Al usar este tipo de baño toda la superficie de la piel estará en el contacto con el gas ClO₂ de 20 a 30 minutos.

Para algunas personas este método ha supuesto una solución definitiva.

Descripción del proceso:

1. Limpiar bien la bañera para. No poner ningún jabón u otros productos químicos en el agua.
2. Activar 30 gotas de MMS (tipo 1:1) mezclándolo en un vaso. Esperar 1 min. Si hay llagas de piel abiertas o heridas severas en el cuerpo habría que considerar el reducirlo a 20 gotas. Las llagas abiertas por lo general se curan rápidamente debido a la acción desinfectante de MMS.
3. Llenar la bañera unos 20-30cm con agua caliente. No añadir jabón, perfume, champú, ni juguetes de niños. Puede combinar el tratamiento en bañera con la toma de unas 5 a 7 de gotas de la manera habitual por separado.
4. Añadir MMS activado a la bañera y mover para repartirlo bien. El agua no reduce la cantidad de gas ClO₂ que está siendo liberado.
5. Tome el baño procurando mojar bien todo el cuerpo, incluso cabeza y cuero cabelludo. Si entra algo de agua en los ojos no hay que preocuparse ya que en esta dosis tan diluida MMS no daña los ojos.
6. Añadir más agua caliente. El calor dilata los poros y penetra al interior del organismo. A partir del tercer baño notara una mejora significativa.

Protocolo intensivo combinado

Este protocolo se usa en casos mas graves, por ej. en enfermedades crónicas, cáncer, hepatitis, Alzheimer etc. Se hace combinado con el MMS-2.

1º) Es básicamente, tomar 3 gotas de MMS activadas cada hora, durante 10 horas al día, durante 30 días o hasta estar bien.

Sin embargo muchas personas no pueden empezar a tomar tantas gotas al inicio y debe comenzar de manera gradual e ir aumentando lentamente según cada caso personal por ej:

1° día, iniciar con una toma de 2 gotas “activadas” (o incluso 1 gota)

Nota: Activarlas significa mezclar en un vaso SECO las gotas de clorito con la misma cantidad de gotas de ácido cítrico esperar un minuto y luego se le agrega el agua necesaria.)

2° día dos tomas de 2 gotas activadas cada una,

3° día tres tomas de 2 gotas activadas.

Así sucesivamente hasta llegar a 10 tomas de 2 gotas cada una, para luego ir aumentando las gotas a tres en cada toma, o sea 30 gotas activadas por día.

Nota: Esto depende siempre de como se sienta cada uno, en caso de malestar (diarrea fuerte o nauseas) o excesivo cansancio (esto es normal no se asuste) disminuir la dosis dos gotas, por uno o dos días (pero no dejar de tomar MMS) y volver a intentar subir al día siguiente. La regla es, si usted siente que las gotas le están haciendo sentirse mal, tomar menos y cuando esta mejor tomar mas.

También tenemos que tomar en cuenta que esto sería lo ideal (10 tomas de 3 gotas cada una), pero si una persona no logra llegar a las 30 gotas (porque no lo soporta) debe llegar a su máximo de tolerancia y mantenerse allí, el MMS será igual de efectivo, solo se prolongara un poco mas la duración del del tratamiento.

Como se prepara: Para hacerlo mas cómodo podemos preparar por la mañana todo lo que vamos a tomar en el día. En una botella que se pueda cerrar herméticamente (por ej. una de agua mineral, no importa que sea de plástico) colocar las gotas a tomar durante el día, ej. supongamos que estamos en el 5° día, (2 gotas x 5 tomas = 10 gotas activadas) ponemos 10 gotas de clorito + 10 gotas de ácido cítrico, agitar, esperar 1 minuto y agregarle la cantidad de agua necesaria.

Nota: No influye la cantidad de agua, ya que el gas (dióxido de cloro, que es el que actúa) que se produce al activar el MMS no se diluye en agua. Osea que lo podemos preparar tanto en una botella de 1 litro o de ½ litro según cada uno. También si nos resulta muy desagradable el sabor se puede agregar, después del agua un chorrito de coca cola (no afecta al MMS) que ayuda a disimular el sabor, o un poco de té fuerte de menta.

Se puede guardar en la heladera, o no. No se preocupe el MMS no pierde su efectividad (dentro de una botella) por unas 20 horas.

Mas detalles a tener en cuenta: No tome vitamina C, jugo de naranja, o jugos industriales (tienen ácido ascórbico o vitamina C) junto al MMS se debe espaciar por lo menos una hora antes o después, igual con el bicarbonato de sodio, y el cloruro de magnesio. Guarde los frascos de MMS en lugar oscuro, MMS no tiene vencimiento, solo cuando no reacciona al mezclarlo con el activador es que ya no sirve.

2°) Después de haber estabilizado la toma de las gotas, o sea cuando ya estamos tomando 30 gotas al día, o al máximo que hemos podido llegar, comenzamos a tomar las cápsulas de MMS-2, junto a las gotas del MMS-1.

Iniciamos esta segunda etapa de apoco, tomando una cápsula el 1° día , si nos sentimos bien, aumentamos a dos cápsulas el 2° día, (si no nos sentimos bien o decaídos no aumentamos sino que continuamos con una hasta que podamos aumentar a 2), y luego a tres cápsulas el 3° día, y a cuatro el 4° día, esto siempre y cuando nos sentimos bien.

Las cápsulas las tomamos entre medio de las tomas del MMS-1, y como dijimos anteriormente esto sería lo ideal (30 gotas y 4 cápsulas) pero si no podemos tomaremos lo que nuestro cuerpo pueda tolerar.

También si queremos combatir mas agresivamente la enfermedad podemos aumentar la efectividad del MMS combinando lo con el DMSO, el dimetilsulfoxido lleva mas profundamente al interior de las células el MMS, lo que hace la curación mas rápida y efectiva. En la preparación del MMS-1 agregamos igual cantidad de gotas de DMSO que de clorito dentro de la botella después de haberlo activado y haber agregado el agua del preparado. (leermas en página de inicio- DMSO)

La idea general es introducir la mayor cantidad de MMS posible en nuestro cuerpo de manera constante, así serán eliminados todos los patógenos que nos enferman, sé que lo propuesto no es fácil, pero debemos pensar que la quimioterapia lo es menos, y además con efectos secundarios devastadores para nuestro organismo, lo que conlleva a una calidad de vida deteriorada, cosa que con el MMS no sucede.

Nota: Para aumentar la cantidad de MMS, podemos también realizar baños en bañera con gotas activadas de MMS una vez a la semana, o mayor cantidad de veces en los casos en que no hemos podido llegar a las dosis máximas (ver protocolo bañera y otras soluciones)

Protocolo de emergencia o de choque

Este es un protocolo a usar cuando tenemos una emergencia o es necesaria una respuesta rápida. se llama 6+6

Tomamos 6 gotas activadas, y a la hora otras 6 gotas activadas y así sucesivamente hasta que pase el peligro o se mejore, luego disminuimos las gotas a tres cada hora hasta que todo mejore significativamente.

No importa en este caso si se presentan vómitos (se esta expulsando toxinas) continuar con el 6+6 mientras sea necesario.

Protocolo en piel

USO SOBRE PIEL

El uso de MMS en la piel puede ser un uso muy importante. Se destruye casi todo tipo de desorden de la piel conocida, y provoca que quemaduras, y heridas de todo tipo puedan sanar a menudo en menos de la mitad del tiempo ordinario.

Utilizar MMS para curar las llagas, quemaduras, heridas, psoriasis, eczema, el cáncer, la tiña, acné, erupciones cutáneas, ulcera diabética, infecciones por estafilococos, pie de atleta, y un centenar de otros problemas.

Para ello, siga estas instrucciones: Conseguir una botella de 30 cm³ tipo spray (difusión niebla).

Protocolos de Piel

MMS se ha reportado para ser eficaz contra las lesiones cutáneas localizadas o enfermedades: [psoriasis](#), acné, heridas, quemaduras, herpes, picaduras de insectos, eczema, cáncer de piel, y mucho más ... Usted puede contribuir, junto con DMSO para una mayor eficiencia.

Use rocío de 8-12 gotas activadas de MMS en una taza normal. Espere 1 minuto hasta que cambie a amarillo / naranja y agregue un poco de agua. Aplicar a las zonas afectadas, espere 1-2 minutos y luego enjuague con agua.

- **Baño de pies:** utilizaca 12 gotas activadas (*contra, hongos, úlceras, heridas, etc ...*)
- **Bañera:** 30 gotas utilización activa (el Clo₂ se funde en el plasma sanguíneo proporciona una mayor concentración de desintoxicación de acción contra los parásitos, levaduras, hongos y otros patógenos.
- **Bolsa de plástico** utilizan 15 gotas activados sin agua en un vaso, deje el vidrio en la parte inferior de la bolsa, entre en la bolsa, cierre con alrededor de su cuello y deje que el gas se evapore la desinfección de las zonas afectadas

Agregue 15 gotas de MMS en la botella y 15 gotas de ácido cítrico (activador) y agitar para mezclar, esperar 1 minuto y luego llenar la botella con agua. Ahora tiene una solución en aerosol que es muy práctica.

Esta solución se mantiene bien durante unos 3 días. (luego tirarla y volver a preparar)

Una vez que usted haya hecho su solución, se debe rociar cualquier llaga o lastimadura o etc., cerca de una vez cada hora o cada dos o tres horas durante todo el día. Deje que la solución se seque sobre la piel o llaga. En caso de una erupción, rociarlo sobre toda la erupción completa.

Enjuague con agua limpia por la noche antes de acostarse, seque, y vuelva a rociar antes de ir a la cama.

En algunos casos (muy pocos) si produce algún tipo de malestar o mayor irritación, en tal caso solo use 7 gotas activadas en lugar de 15.

Usar en cualquier tipo de heridas, o sea usarlo como un normal desinfectante por ejemplo en vez del alcohol así se disminuirá el tiempo de curación por una gran mayoría de los casos en que los microorganismos son la causa de la lenta curación.

Si cuando lo colocamos sobre una llaga, ulcera etc. y sentimos mucho ardor simplemente enjuagar con abundante agua.

Protocolo de oídos

Infección de oídos (Otitis):

2 a 3 gotas de MMS activadas en un vaso mini, muy pequeño (7 cm³) o en una tapa , esperar 1 minuto hasta que cambie a color ámbar y después añadir agua tibia. Llenar un gotero y colocar de 2 a 3 gotas en el oído. Dejar un minuto e inclinarse para que caiga el exceso, dejar secar, repetir el procedimiento tres veces al día.

Si siente algún tipo de ardor (en algunos casos puede arder de acuerdo a la sensibilidad o estado del oído) al cabo de uno o dos minutos de haber colocado las gotas, lavar con una perilla de agua tibia, o con el mismo gotero con agua tibia; Si esto se repite (el ardor cuando coloco las gotas) hacer el protocolo con una gota menos de MMS (2 o 1 según haya comenzado con 2 o 3) e intentar en las próximas colocaciones aumentar la dosis nuevamente.

Protocolo oídos

Para las infecciones del oído:

Use 2-3 gotas de MMS activado en un vaso muy pequeño (20 oz o cl 6-8), espere hasta que cambie a amarillo / ámbar, y luego agregar agua caliente. Llenar un gotero y gotear poco a poco en el oído.

Protocolo en enemas

En el intestino grueso se alojan gran cantidad de bacterias (buenas y malas) una limpieza intestinal es muy recomendable en todos los casos. El MMS no ataca la flora intestinal (bacterias buenas)

El mejor procedimiento es:

1- hacerse una enema normal con un irrigador tipo jarra, con un litro de agua tibia. Y evacuar el intestino. Esperar 30 minutos.

2- Activar 10 gotas de mms con el ácido cítrico esperar un minuto y agregarlo a la segunda enema que contiene dos litros de agua tibia, una vez terminado el liquido, retener el mayor tiempo posible, y luego evacuar . Después es mejor reposarse un poco.

Atención si usted no está acostumbrado a las enemas o le resulta fastidioso las dos enemas, haga solo el paso número dos, o sea una enema de dos litros de agua con 10 gotas activadas de mms.

Recomendado combinar este protocolo con la toma de gotas de MMS

Hacer este protocolo solo una vez al día.

El uso de MMS en un enema.

(*Proctitis, vaginitis, enfermedades rectales o de vagina*). Use 3-5 gotas activadas de MMS en un vaso normal, espere un minuto hasta que cambie a amarillo / naranja, y luego agregar agua caliente. Llenar un irrigador e introducir en el recto (o la vagina), retenga de agua durante unos 2-4 minutos, y luego evacuar.

Protocolo bucal

Aplicaciones bucales: (Estomatitis aguda, abscesos dentales, úlceras, inflamación de garganta, caries e infecciones varias)

Activar 5 gotas de MMS en un vaso vacío de vidrio (esperar 1 minuto para la activación hasta que cambie a color ámbar) después añadir la mitad del vaso con agua.

A continuación cepillar los dientes con la solución. Se puede también hacer buches y/o gargarismos.

Al terminar es importante enjuagar la boca con agua.

Para caries: Cepille sus dientes, encías y lengua con 10 gotas de MMS activado por cada onza de agua (1oz = 28ml).

Active 3 gotas en un recipiente plástico o vaso pequeño, coloque su boca sobre la boca del recipiente. No respire los vapores por su nariz. Simplemente deje que el vapor entre en su boca y dientes durante 5 minutos y no más.

Protocolos en ojos

Este es un protocolo delicado, ya que los ojos son muy sensibles.

Comenzar con una gota activada en un vaso pequeño 10 cm³ esperar un minuto y llenarlo de agua tomar una gota con un gotero y colocarla en el lagrimal**, esperar dos minutos y enjuagar con agua, repetir 4 veces al día, usando la misma solución, que sería conveniente colocarla en un recipiente que se pueda cerrar (un frasco por ejemplo) y guardarla a lo oscuro, por todo ese día.

Si no hubieran inconvenientes ni ardores al segundo día volver a preparar la solución de igual manera y colocar dos gotas 4 veces al día.

Al tercer día volver a preparar la solución, colocar una gota y no enjuagar si no arde repetir 4 veces al día.

Continuar hasta la cura definitiva.

** Si produce mucho ardor, (a veces es posible que suceda especialmente por el ácido cítrico) enjuagar con agua inmediatamente, luego continuar pero esta vez colocando una gota del vaso ya preparado y diluirla en 10 gotas de agua y luego colocar en el lagrimal, repetir 4 veces al día y luego ir aumentando la dosis.

Protocolo de Spray

La botella de Spray de MMS se utiliza de manera externa contra el cáncer, hongos, problemas de la piel, infecciones, tumores, hemorroides, caspa, enfermedades bucales, etc. También puede acompañarse con DMSO (protocolo 3000) como un vehículo que penetre en la piel y tejido. Use la botella de Spray MMS para la higiene en general.

Active 40 gotas de MMS en una botella estándar de Spray, luego de 1 minuto de activación añada agua limpia y úselo durante el día.

Protocolo Inhalación

Nariz, senos paranasales, Bronchical

Este protocolo MMS viene con precauciones, pero es muy eficaz en la eliminación de goteo post-nasal, sinusitis, infecciones del oído, resfriados, dolor de garganta, respiración sibilante, bronquitis, y los gérmenes que viven en el moco de la nariz o los senos paranasales. Incluso las infecciones del oído interno se informa, se benefician de este tratamiento. Sin embargo, hay PRECAUCIONES.

Usted será la inhalación de pequeñas cantidades de gas ClO₂ en una taza en la nariz o la boca. OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES.

No beba la mezcla en este protocolo, porque no se añade agua a la MMS activa en este caso. No exceda la caída de una mezcla de 2 o 3. Recuerde que es el gas ClO₂ generada por MMS que es todo el beneficio que elimina gérmenes. A diferencia de la mezcla de MMS que usted bebe, este método de la nariz, inhalando el gas ClO₂ pura proporciona probablemente la forma más rápida y la mayoría de los germicidas para mover el gas rápidamente a los lugares en la cabeza y los senos donde se puede encontrar fácilmente los gérmenes y los matan.

Sin embargo, una severa advertencia se dice - NO sobredosis. NO DeepBreath el gas ClO₂ en los pulmones por largo tiempo. Los pulmones pueden absorber rápidamente el gas ClO₂

tan fácilmente como el oxígeno, provocando el agotamiento de oxígeno inesperado. Tome descansos y respirar aire normal, periódicamente mientras se hace este procedimiento. Esta advertencia se repite varias veces. SI SOBREDOSIS y la respiración profunda que puede lesionar sus pulmones.

Como se sugiere en los "fundamentos" del protocolo, se pueden mezclar 2 a 3 gotas de MMS con la normal de ácido (vinagre sin filtrar o ácido cítrico o jugo de limón) con 5 gotas de ácido por cada gota de un MMS. Haced esto en una taza pequeña. No agregue agua o cualquier otra cosa. NO beber la mezcla.

Casi de inmediato se le huele el gas ClO₂. Sosteniendo la copa debajo de su nariz tirar en el gas poco a poco, con el objetivo de dejar que una pausa para circular por las cavidades nasales y senos paranasales. Que, naturalmente, también el flujo a través de la garganta y las cuerdas vocales, hasta cierto punto. Aliento que en la nariz muy lentamente de manera que permanece un poco en todos los lugares se puede ir. Sostienen que la respiración por unos segundos. El olor ClO₂ incluso se flotaba en los tubos de eustation y, a veces a los oídos internos.

Después de cada cuatro acciones inhalación lenta, mover la taza, y disfrutar de respiración de aire normal.

Razón para la cautela. Usted se está moviendo el gas ClO₂ puro directamente en el cuerpo. Los glóbulos rojos lo absorben tan fácilmente como el oxígeno. Por lo tanto, será temporalmente la disminución de la cantidad de oxígeno disponible para el cuerpo.

NO utilice este método si usted sufre de angina de pecho, o si usted es dependiente de oxígeno suplementario para respirar, o si tiene dificultad para respirar, o en si ha estado usando MMS internamente (con agua potable) por encima del nivel de caída de 10 las últimas dos horas.

Cuando usted toma dosis MMS, el ClO₂ se genera poco a poco. Los glóbulos rojos recogen el oxígeno de los pulmones normales, pero quizás el 20% de ellos accidentalmente no se cargue de oxígeno. Un poco más tarde la sangre pasa a todo el revestimiento del estómago y el 20% de los glóbulos rojos que carecían de la absorción de oxígeno por ClO₂, porque parece que el oxígeno a los glóbulos rojos. Por lo tanto en condiciones normales de uso MMS (cuando potable), el oxígeno que está disponible en el cuerpo tal como es normal y la cantidad de ClO₂ absorción es auto-limitante, porque el 80% (por ejemplo) de los glóbulos rojos son el suministro de oxígeno a los cuerpo como lo hacen normalmente.

En resumen: cuando la respiración ClO₂ como un gas de nueva producción en una taza pequeña, ya que se mantiene durante unos segundos en los senos, la nariz, y las cuerdas vocales, que tiene efectos inmediatos como germicida se encuentra con los gérmenes y patógenos en el camino, por lo tanto reducir la generación de moco y la flema.

Gérmenes de los resfriados y los virus de la gripe vivos en el moco producido por el cuerpo en reacción a los gérmenes o virus. Los pulmones y los senos comienzan a llorar, la generación de líquidos pegajosos en los senos paranasales, los pulmones y bronquios. Los

gérmenes se siguen reproduciendo y continuar el viaje en que el moco - a menos que los gérmenes mueren a manos de un agente externo, como MMS.

Es muy importante que nadie tenga una mala experiencia con MMS. Así que, como precaución adicional, pensar en los resultados si tontamente sobredosis con este protocolo:

1. En lugar de un 15% de los glóbulos rojos llevando ClO₂ en todo el cuerpo, que podrían desplazar el oxígeno necesario si el 25% o 30% de sus células rojas de la sangre recogida ClO₂ en lugar de oxígeno. Por lo tanto, después de 4 o 5 inhalaciones lenta y profundamente de la copa, tomar un descanso para que su suministro de oxígeno no disminuya a su cerebro o el cuerpo.

2. Dado que este método proporciona ClO₂ puro directamente en el cuerpo, que se distribuirá rápidamente por todo el cuerpo como consecuencia de matanza rápida de patógenos en todo el cuerpo - podría ocasionar náusea severa y repentina, como los restos de desintoxicación rápida se ha derramado demasiada rapidez a la sangre.

3. Tejidos de los pulmones puede ser quemado o dañado sin que sea consciente de que está sobredosis.

4. Puede perder el conocimiento de la respiración profunda irreflexiva. El olor del gas ClO₂ es muy fácil de respirar. A diferencia del mal gusto de MMS activado en el agua, el olor de los MMS no es lo suficientemente fuerte para evitar una sobredosificación. De hecho, usted puede pensar que no pasa nada y puede ser engañado en el pensamiento de que dosis más fuertes o la respiración profunda puede ser tolerado. Sea precavido y NO sobredosis.

5. Colocar activado MMS en un humidificador que mantener un flujo continuo de ClO₂ olor en el aire durante una o dos horas, pero no hay necesidad de hacer esto por el peligro de dormir o vivir en un estado de falta de oxígeno. La habitación tiene un montón de oxígeno de los pulmones, pero absorbe el ClO₂ tan fácilmente como el oxígeno, que es una situación peligrosa si se prolonga por mucho tiempo.

6. Saque a las mascotas y aves de la habitación si está utilizando el gas ClO₂ como una forma de eliminar hongos y moho de una habitación. Cerrar las puertas durante la hora de la limpieza de sala de ClO₂. Para la purificación de una habitación, coloque una mezcla de caída del 10 al 20 de MMS activado en un plato o una taza en el centro de la sala, a continuación, cierre y se deja durante una hora. El ClO₂ humo saldrá lentamente y llenar la habitación con el tiempo.

A pesar de que puede vencer a los resfriados y las infecciones de los senos con la estrategia de la inhalación, las personas se dejan a menudo con la congestión pegajoso en los pulmones. El cuerpo sabe que no debería estar allí y empieza a toser involuntario. MMS no le ayuda a vivir a través de días de tos, y en algunos casos la tos puede ser mortal a pesar de que los gérmenes están siendo destruidos por las dosis normales de MMS

Enfermedades orales:

Enfermedades orales:

Para la enfermedad oral (estomatitis, [gingivitis](#), abscesos dentarios, úlceras, peritonitis, infecciones de la boca).

Use 5 gotas de MMS activado en un pequeño vaso. Agregar el agua y cepillar los dientes con la solución. Después del cepillado, es importante que se enjuague la boca con agua.

En emergencias:

En emergencias:

En los casos de dolor severo, rápido aumento de la infección o enfermedad desconocida repentina, este protocolo es para un resultado rápido primera necesidad - especialmente si hay condiciones específicas agudas. Tome 6 gotas de MMS activados, y después de 2 horas, otros 6 gotas. Luego tomar 3 gotas cada 2 horas. Pronto debería haber una clara mejora. La última dosis antes de acostarse puede ser mayor, dependiendo del caso y la tolerancia.

Para evitar el contagio

Para evitar el contagio:

Activar 10-12 gotas en un vaso seco, no agregue agua y ponerla en el dormitorio donde evapora lentamente. Su funcionamiento es muy eficaz contra el contagio de su compañero si él está durmiendo a su lado, o si hay más de 1 niño en la misma habitación. Deje el MMS unos 1-2 metros de distancia a la persona enferma.

Contra el mal olor corporal:

MMS es un desodorante magnífica, ya que elimina la causa del olor corporal fuerte, atacando y destruyendo su causa raíz: las bacterias y hongos. MMS es muy eficaz contra olor de las axilas, olor de los pies, etc.

Una vez al día o cada dos días dependiendo de cada individuo. Use 3-5 gotas de MMS activado en un pequeño vaso, espere hasta que el color cambia a amarillo / ámbar, a continuación, agregue un poco de agua. Aplicación a las zonas afectadas, espere 1-2 minutos (esto se puede hacer con un algodón o un aerosol) y luego enjuague con agua o tomar una ducha.